

Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

MAXON FORTE

50 mg, tabletki powlekane (syldenafil)

Informacja dla farmaceutów

Do każdego opakowania leku **MAXON FORTE** dołączone jest narzędzie diagnostyczne (ankieta) dla pacjenta. **Pamiętaj, żeby zalecić pacjentowi wypełnienie ankiety** (narzędzia diagnostycznego) **przed przyjęciem leku** (ankieta różni się od tej dla leku **MAXON ACTIVE, 25 mg**).

Ankieta umieszczona jest również na stronie internetowej podmiotu odpowiedzialnego (www.maxonforte.pl/ankieta).

Wybór odpowiedniej dawki

Jeżeli po wypełnieniu ankiety pacjent będzie mógł zastosować syldenafil, pomóż mu dobrać odpowiednią dawkę leku:

- zaproponuj pacjentowi produkt w dawce 25 mg (**MAXON ACTIVE, 25 mg**), **jeśli pacjent nie stosował do tej pory w ogóle leku z syldenafilem lub lek w dawce 25 mg okazał się wystarczająco skuteczny;**
- produkt w dawce 50 mg (**MAXON FORTE, 50 mg**) będzie odpowiedni, **jeśli stosowane dotychczas przez pacjenta leki z syldenafilem w dawce 25 mg były nieskuteczne lub pacjent stosował już syldenafil dawce 50 mg (lub większej).**

Inne ważne informacje

Jeżeli pacjent zapyta o stosowany przez siebie lek (lub leki), którego nazwa nie jest wymieniona w ankiecie, zweryfikuj i poinformuj pacjenta czy dany lek zawiera substancję czynną wymienioną w ankiecie i czy występuje ryzyko potencjalnie niebezpiecznych interakcji z syldenafilem.

Zwróć szczególną uwagę pacjenta na kwestie chorób sercowo-naczyniowych oraz możliwych interakcji z lekami wymienionymi w ankiecie. Warto również poinformować pacjenta, że zaburzenia wzrodu mogą mieć związek z innymi schorzeniami (np. nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia).

Zaleć pacjentowi, żeby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku **MAXON FORTE** udał się do lekarza w celu zdiagnozowania potencjalnych schorzeń i czynników ryzyka związanych z zaburzeniami erekcji.

Szczegółowe informacje na temat leku **MAXON FORTE** możesz znaleźć w Charakterystyce produktu leczniczego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Wszelkie podejrzane działania niepożądane proszę zgłaszać do:

- Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
- Podmiotu Odpowiedzialnego: Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, e-mail: pv@adamed.com, tel. (24h): +48 22 732 7707.

ANKIETA (narzędzie diagnostyczne)

UWAGA!

Ten lek **MAXON FORTE**, zawierający syldenafil, przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek jest dla Ciebie, jeśli jesteś dorosłym (> 18 r.ż.) mężczyzną, a problemy ze wzrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. Jeżeli nie spełniasz przynajmniej jednego z powyższych warunków, ten lek **NIE** jest dla Ciebie!

	TAK	NIE WIEM	NIE
a) Czy stosujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których przyjmowanie wraz z lekiem MAXON FORTE może zagrażać Twojemu życiu?			
1. nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. izosorbid (np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard, Sorbonit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. molsidominę (np. Molsidomina WZF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. nikorandyl (np. Angedil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Czy występują u Ciebie następujące objawy?			
1. w ciągu ostatnich 2 miesięcy pojawiają się ból za mostkiem w klatce piersiowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. zwykła , codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. często miewasz zawroty głowy, wrażenie omdlewania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?			
1. w ostatnich 6 miesiącach przeżyłeś zawał serca lub udar mózgu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. w przeszłości doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. masz skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub rozpoznaną chorobę Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające syldenafil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. stosujesz leki z powodu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach), takie jak riociguat (np. Adempas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwińkową)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. rozpoznano u Ciebie marskość wątroby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Czy obecnie chorujesz na:			
1. chorobę wrzodową, której dolegliwości nasiliły się w ostatnim tygodniu (ból brzucha, nudności, wymioty)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. białaczkę (choroba nowotworowa krwi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NIE,
nie możesz stosować leku MAXON bez konsultacji z lekarzem

przynajmniej 1 x TAK
lub 1 x NIE WIEM


wszystkie NIE

Dokonaj teraz wyboru
bezpiecznej dawki leku
MAXON

	TAK	NIE WIEM	NIE
e) Czy stosujesz leki alfa-adrenolityczne używane do łagodzenia objawów rozrostu gruczołu krokowego (prostaty, stercza) i/lub w nadciśnieniu tętniczym?			
1. doksazosynę (np. Apo-Doxan, Cardura, Doxagen, DoxaLEK, Doxalong, Doxanorm, Doxar, Doxazosin, Doxonex, Doxorion, Dozox, Kamiren, Zoxon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. terazosynę (np. Hytrin, Kornam, Setegis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. alfuzosynę (np. Alfabax, AlfuLEK, Alfurion, Afluzostad, Alugen, Dalfaz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. silodosynę (np. Silodyx, Urorec)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. tamsulosynę (np. Adatam, Apo-Tamis, Bazetham, Duodart, Fokusin, Miktosan, OMI-TAM, Omnic, Omsal, Prostamnic, Ranlosin, Solesmin, Suproktiv, Symlosin, Tamiron, TamsiPRAS, Tamsudil, Tamsugen, Tamsulek, Tamsulosin, Tamsunorm, Tanyz, Uprox, Urostad, Vesomni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Czy jesteś obecnie w trakcie leczenia lekami przeciwbakteryjnymi (antybiotykami)?			
1. erytromycyną (np. Davercin, Erythromycinum TZF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. klarytromycyną (np. Apiclar, Fromilid, Klabax, Klabion, Klabiotic, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. telitromycyną (np. Ketek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. cyprofloksacyną (np. Ciphin, Ciprinol, Ciprobay, Ciprofloxacina, Ciprolon, Cipronex, Cipropol, Proxacin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Czy stosujesz poniższe leki?			
1. itrazonazol (np. Ipozumax, Itraconazole, ItraGen, Itrax, Itrakast, Itromyx, Orungal, Trioaxal) - lek przeciwgrzybiczy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ketokonazol (np. Ketokonazol, Ketoconazole Hasco, Ketoconazole HRA) - stosowany w leczeniu zespołu Cushinga (nadmiernego wytwarzania kortyzolu w organizmie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Czy lekarz rozpoznał u Ciebie:			
1. zaburzenia czynności nerek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. zaburzenia czynności wątroby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

przynajmniej 1 x TAK
lub 1 x NIE WIEM

wszystkie NIE



Przed zastosowaniem leku przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania

PAMIĘTAJ!

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz stosować lek MAXON lub masz problem z wyborem dawki, przed użyciem leku skonsultuj się z farmaceutą. Problemy ze wzrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzrodu. Występowanie zaburzeń wzrodu jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym serca. Dlatego też w trakcie okresowych wizyt, zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzrodem i o tym, że przyjmujesz MAXON.